


## AKRA système de fertilisation pour la betterave sucrière

08.2020

### Zuckerrübenbau Entwicklungsstadien



	00	07	09	10	12	14	15-16	39	49	
Deckfrucht	Vor der Saat	Keimung (Wurzel)	Keimling kurz vor Aufgang	Keimblatt-Stadium	1. Laubblattpaar (2-Blatt-Stadium)	2. Laubblattpaar (4-Blatt-Stadium)	4- bis 6-Blatt-Stadium	Kurz vor Reihenschluss		Nach der Ernte

### Fertilisation du sol et traitement des semences

#### Fertilisation du sol

AKRA Kombi 300-350 kg  
AKRA DGC selon les résultats de l'analyse du sol fractionnée

#### Traitement des semences

Suivant les consignes d'application pour le traitement des semences

### Fertilisation foliaire

#### Période d'application

1. Pulvérisation: Stade 14-16
2. Pulvérisation: Stade 39-40
- 3-4. Pulvérisation: au besoin (ajuster la concentration de la bouille à la quantité élevée d'eau)

### Aufwandmenge (pro ha)

Eau	150-200 l
AKRA Plus 9	0,5 l
AKRA Blatt	2 l
Fungicid	au besoin (50 % de la dose d'application recommandée)
AKRA MSB	1 l
AKRA Azotobacter	0,5 l
AKRA Sulpur+	1 l
AKRA WD	0,5 l
Urée	10 kg

### Informations

- Épandre max. 80 kg d'azote N par ha
- Ajuster le pH de l'eau pulvérisée à l'aide d'acide citrique à 5,5.
- D'autres additifs sont à ajouter – l'un suivant l'autre – après avoir ajusté le pH.
- Veuillez veiller l'ordre des produits à ajouter.
- Ne pas pulvériser sous exposition directe au soleil.
- 4 jours avant et après application d'un herbicide, ne pas appliquer d'engrais foliaire AKRA.